



Wann (Jahreszeit)

Balzflüge Mitte Mai bis Anfang Juli

Wann (Tageszeit)

Tagaktiv, Flugbeobachtungen vor allem um die Mittagszeit an sonnigen Tagen (Thermik).

Habitat

Abwechslungsreich strukturierte Landschaften mit Altholzbeständen. Gern in Bach- und Flussniederungen mit Auwaldkomplexen. Auch in Bergwäldern.

Artnachweise

B4, B5, B9, C11a (Wabenfund unter Nest), C14b, C16



Lutz und Böttner (um 1930) SLUB / Deutsche Fotothek



Besonderheiten

Sehr heimliche Art, die schwer zu erfassen ist. Nestersuche im Winter sinnvoll, allerdings häufig Neubau. Neue Nester sind oft recht klein. Nester werden auch im Kronenbereich, schlecht einsehbar, angelegt.



Lutz und Böttner (um 1930) SLUB / Deutsche Fotothek

Flugbeobachtungen mit auffälligen Paarflügen von Mitte Juli bis Mitte August sind am besten geeignet, um Reviere auszumachen.

Beobachtungen sind stark wetterabhängig, bei Regen und Kälte nur geringe Aktivität.

Ab Mitte Juli sind oft bettelnde Jungvögel im Nest zu hören.